

Link do produktu: <https://www.kopytkowo.com.pl/pavo-colostrum-150g-p-870.html>

Pavo Colostrum 150g

Cena	255,00 zł
Dostępność	3-10 dni
Numer katalogowy	pavo-colostrum
Producent	PAVO

Opis produktu

Pavo Colostrum jest szansą dla źrebięcia w sytuacji gdy klacz ginie podczas porodu lub pojawia się problem z laktacją.

Produkt ma dostosowaną specjalnie do potrzeb źrebiąt kompozycję i w pełni odpowiada siarze matki. Siara to pierwsze mleko klaczy zawierające duże ilości białka, tłuszczu i związków mineralnych, ale przede wszystkim zawierające przeciwciała, których źrebiak nie otrzymuje wcześniej za pośrednictwem pępowiny. Są one konieczne do wytworzenia bariery przed bakteriami i wirusami, zapewniają miejscową ochronę jelit oraz mają działanie przeczyszczające, dzięki czemu usunięcie smółki (czyli pierwszych odchodów) staje się możliwe. Siara jest więc niezbędna i gwarantuje dobry start źrebięciu. Niestety, przeciwciała są wchłaniane przez niedojrzałą barierę jelitową tylko przez pierwsze 12 godzin, dlatego tak ważne jest, aby źrebię napiło się siary przed upływem tego czasu, a najlepiej – w ciągu pierwszych trzech godzin życia.

W sytuacjach gdy natura zawodzi Pavo Colostrum i Pavo Foal Milk (mleko zastępcze) są najlepszym rozwiązaniem.

Zastosowanie:

- osierocone źrebięta
- źrebięta, których matki mają problem z laktacją lub wytworzeniem siary
- źrebięta, które znalazły się w sytuacji konfliktu serologicznego i nie mogą pobrać naturalnej siary matki

Zalety:

- łatwa i szybka w przygotowaniu alternatywa dla naturalnej siary
- dostarcza źrebięciu niezbędnych przeciwciał i umożliwia wytworzenie bariery ochronnej organizmu
- chroni jelita i pobudza je do pracy
- ma działanie przeczyszczające, dzięki czemu usunięcie smółki staje się łatwiejsze

Porada żywieniowa / przygotowanie preparatu

Krok 1: Przygotowanie preparatu mleko-zastępczego (Pavo FoalMilk)

1. Używamy naczynia o pojemności co najmniej 1 litra.
2. Wlewamy 300 ml zimnej, przegotowanej wody
3. Dolewamy 400 ml wrzącej wody, co daje nam 700 ml wody o temperaturze ok. 60 stopni
4. Dodajemy jedną miarkę preparatu (co odpowiada 100 gr) i mieszamy aż do dokładnego rozpuszczenia

-
5. Dodajemy, stale mieszając, 300 ml zimnej wody. Otrzymujemy dzięki temu 1 litr letniego preparatu mleko-zastępczego (o temperaturze około 40 stopni)

Krok 2: Przygotowanie siary (Pavo Colostrum)

1. Dodajemy jedną całą saszetkę (150 gramów) siary Pavo Colostrum do 1 litra wcześniej przygotowanego mleka
2. Mieszymy do całkowitego rozpuszczenia się proszku
3. Sprawdzamy raz jeszcze temperaturę przygotowanego płynu (najlepiej na wewnętrznej stronie przedramienia)

Krok 3: Podawanie siary

1. Przygotowane mleko z siarą przelewamy do butelki
2. Nożyczkami odcinamy końcówkę smoczka, tak żeby powstał niewielki otwór, przez który źrebię będzie mogło ssać mleko
3. Podajemy co godzinę około 250 ml ciepłej, nie gorącej siary

Po wypiciu przez źrebię całej porcji przygotowanego mleka z siarą, powtarzamy kroki od 1-3 w celu przygotowania drugiej porcji siary Pavo Colostrum.

Po jej podaniu źrebię może być już karmione wyłącznie preparatem mleko-zastępczym Pavo FoalMilk.

Uwagi:

- na kolejne karmienia najlepiej podgrzewać przygotowane wcześniej mleko z siarą w kąpieli w naczyniu wypełnionym gorącą wodą
- przygotowanej mieszanki mleka i siary nie można podgrzewać w mikrofalach, ponieważ zawarte w niej przeciwciała mogą tracić swoje właściwości przy wyższej temperaturze
- dla uzyskania pełnej odporności źrebięcia istotne jest podanie dwóch saszetek Pavo Colostrum